



Уважаемый пациент

Если вас беспокоят боли в животе, изжога, тошнота, быстрое насыщение после еды, отрыжка, то основной причиной жалоб может оказаться инфекция Хеликобактер пилори - главный возбудитель гастритов и язв желудка.

Активность бактерии хеликобактер пилори в желудке человека может привести к ряду неприятных последствий – на фоне раздражения и воспаления слизистой быстро развиваются хронические заболевания разного уровня сложности. Для выздоровления очень важно избавиться от источника проблемы, а чтобы обнаружить бактерию и установить её причастность к текущему состоянию пациента необходимо провести ряд диагностических исследований.

Современное выявление данной бактерии и эффективное лечение позволяют предотвратить болезни и их осложнения.

Один из методов диагностики наличия данного микроорганизма – дыхательный тест.

В нашем медицинском центре вы можете пройти уреазный тест для быстрого определения *Helicobacter pylori*.

Для того чтобы результат теста был максимально точным, важно подготовиться к его проведению заранее. Пациенту необходимо чётко следовать нескольким простым рекомендациям:

- приём любых антибиотических или антисекреторных средств должен быть прекращён за месяц (30 дней) до запланированного анализа;
- за 6 часов до проведения уреазного теста нельзя принимать никакой пищи;
- две недели перед анализом также нельзя принимать так называемые ингибиторы протонного насоса (такие препараты, как пантопразол или омепразол);
- за трое суток нужно отказаться от употребления бобовых продуктов и алкоголесодержащих напитков;
- три часа перед тестом нельзя курить, пользоваться жевательной резинкой;
- в день обследования нужно хорошо очистить ротовую полость и зубы.